

Cours de Statistiques Inférentielles

CQLS : cqls@upmf-grenoble.fr

9 février 2017

Plan

1 Rédaction standard

2 Problématiques avec 1 paramètre

3 P -valeur (suite)

4 Exercices (1 échantillon)

Rédaction standard

Rédaction standard d'un test d'hypothèses paramétrique

Hypothèses de test :

$$\mathbf{H}_0 : \theta = \theta_0 \text{ versus } \mathbf{H}_1 : \begin{cases} \theta > \theta_0 & \mathbf{(a)} : \text{unilatéral droit} \\ \theta < \theta_0 & \mathbf{(b)} : \text{unilatéral gauche} \\ \theta \neq \theta_0 & \mathbf{(c)} : \text{bilatéral} \end{cases}$$

Statistique de test sous \mathbf{H}_0 :

$$\widehat{\delta_{\theta, \theta_0}}(\mathbf{Y}) \rightsquigarrow \mathcal{L}_0 \text{ (à préciser selon problématique)}$$

Règle de décision : on accepte \mathbf{H}_1 si

$$\begin{cases} \mathbf{(a)} : \widehat{\delta_{\theta, \theta_0}}(\mathbf{y}) > \delta_{\lim, \alpha}^+ \text{ ou p-valeur(droite)} < \alpha \\ \mathbf{(b)} : \widehat{\delta_{\theta, \theta_0}}(\mathbf{y}) < \delta_{\lim, \alpha}^- \text{ ou p-valeur(gauche)} < \alpha \\ \mathbf{(c)} : \left(\widehat{\delta_{\theta, \theta_0}}(\mathbf{y}) < \delta_{\lim, \alpha/2}^- \text{ ou } \widehat{\delta_{\theta, \theta_0}}(\mathbf{y}) > \delta_{\lim, \alpha/2}^+ \right) \text{ ou p-valeur(bi)} < \alpha \end{cases}$$

Un tableau récapitulatif pour les instructions R

$H_1 : \theta < \theta_0$	$H_1 : \theta > \theta_0$	$H_1 : \theta \neq \theta_0$
Affirmation d'intérêt		
Statistique de test sous H_0		
$\widehat{\delta_{\theta, \theta_0}}(\mathbf{Y}) \rightsquigarrow \mathcal{L}_0 \stackrel{R}{=} \text{loi}(\dots)$		
Le jour J avec les données y		
$\widehat{\delta_{\theta, \theta_0}}(\mathbf{y}) \stackrel{R}{=} \text{deltaEst.H0}$		
Quantile(s)		
$\delta_{lim, \alpha}^- \stackrel{R}{=} \text{qloi}(\alpha, \dots)$	$\delta_{lim, \alpha}^+ \stackrel{R}{=} \text{qloi}(1 - \alpha, \dots)$	$\delta_{lim, \frac{\alpha}{2}}^- \stackrel{R}{=} \text{qloi}(\alpha/2, \dots)$ $\delta_{lim, \frac{\alpha}{2}}^+ \stackrel{R}{=} \text{qloi}(1 - \alpha/2, \dots)$
P-valeur		
$p\text{-val(gauche)} \stackrel{R}{=} \text{ploi}(\text{deltaEst.H0}, \dots)$	$p\text{-val(droite)} \stackrel{R}{=} 1 - \text{ploi}(\text{deltaEst.H0}, \dots)$	$p\text{-val(bi)} \stackrel{R}{=} 2 * \text{ploi}(\text{deltaEst.H0}, \dots)$ si $p\text{-val(g)} < p\text{-val(d)}$ $2 * (1 - \text{ploi}(\text{deltaEst.H0}, \dots))$ sinon

Plan

1 Rédaction standard

2 Problématiques avec 1 paramètre

3 P -valeur (suite)

4 Exercices (1 échantillon)

Nbre de paramètres pour décrire H_1 ?


2 paramètres

1 paramètre


Nbre de paramètres pour décrire H_1 ?

1 paramètre

Nbre de paramètres pour décrire H_1 ?



Nbre de paramètres pour décrire \mathbf{H}_1 ?



Données : $\mathbf{Y} = (Y_1, \dots, Y_n)$ avec $n \geq 30$ (n grand).

Statistique de test sous \mathbf{H}_0 :

p^\bullet	$\widehat{\delta_{p^\bullet, p_0}}(\mathbf{Y}) := \frac{\widehat{p^\bullet}(\mathbf{Y}) - p_0}{\sqrt{\frac{p_0 \times (1 - p_0)}{n}}} \stackrel{\text{approx.}}{\rightsquigarrow} \mathcal{N}(0, 1)$
μ^\bullet	$\widehat{\delta_{\mu^\bullet, \mu_0}}(\mathbf{Y}) := \frac{\widehat{\mu^\bullet}(\mathbf{Y}) - \mu_0}{\widehat{\sigma_{\mu^\bullet}}(\mathbf{Y})} \stackrel{\text{approx.}}{\rightsquigarrow} \mathcal{N}(0, 1)$
σ_\bullet^2	$\widehat{\delta_{\sigma_\bullet^2, \sigma_0^2}}(\mathbf{Y}) := \frac{\widehat{\sigma_\bullet^2}(\mathbf{Y}) - \sigma_0^2}{\widehat{\sigma_\bullet^2}} \stackrel{\text{approx.}}{\rightsquigarrow} \mathcal{N}(0, 1)$

Nbre de paramètres pour décrire \mathbf{H}_1 ?

1 paramètre

Gaussien

Données : $\mathbf{Y} = (Y_1, \dots, Y_n)$ avec $Y \rightsquigarrow \mathcal{N}(\mu^*, \sigma_*)$

Statistique de test sous \mathbf{H}_0 :

μ^*	$\widehat{\delta_{\mu^*, \mu_0}}(\mathbf{Y}) := \frac{\widehat{\mu^*}(\mathbf{Y}) - \mu_0}{\widehat{\sigma_{\mu^*}}(\mathbf{Y})} \rightsquigarrow \mathcal{St}(n-1)$
σ^2_*	$\widehat{\delta_{\sigma^2_*, \sigma^2_0}}(\mathbf{Y}) := (n-1) \times \frac{\widehat{\sigma^2_*}(\mathbf{Y})}{\sigma^2_0} \rightsquigarrow \chi^2(n-1)$

Plan

1 Rédaction standard

2 Problématiques avec 1 paramètre

3 P -valeur (suite)

4 Exercices (1 échantillon)


Exemple compétence Alfred

Assertion d'intérêt : Alfred est compétent $\Leftrightarrow \mathbf{H}_1 : \sigma_A^2 < 0.1$.

Décision (au vu des $n = 20$ données) :

Accepter \mathbf{H}_1 si $\widehat{\delta}_{\sigma_A^2, 0.1}(\mathbf{y}^A) < \delta_{lim, \alpha}^-$

Loi de $\widehat{\delta}_{\sigma_A^2, 0.1}(\mathbf{Y}^A)$ sous $\mathbf{H}_0 : \sigma_A^2 = 0.1 \Leftrightarrow \delta_{\sigma_A^2, 0.1} = 19$



$$\widehat{\delta}_{\sigma_A^2, 0.1}(\mathbf{y}^A) = 19 * \text{var}(\mathbf{y}^A) / 0.1 = 13.919 < \delta_{lim, 5\%}^- = \text{qchisq}(.05, 19) = 10.117$$


Exemple compétence Alfred

Assertion d'intérêt : Alfred est compétent $\Leftrightarrow \mathbf{H}_1 : \sigma_A^2 < 0.1$.

Décision (au vu des $n = 20$ données) :

Accepter \mathbf{H}_1 si $p - \text{valeur(gauche)} < \alpha$

Loi de $\widehat{\delta}_{\sigma_A^2, 0.1}(\mathbf{Y}^A)$ sous $\mathbf{H}_0 : \sigma_A^2 = 0.1 \Leftrightarrow \delta_{\sigma_A^2, 0.1} = 19$




$$p - \text{valeur(gauche)} \stackrel{R}{=} \text{pchisq}(19 * \text{var}(yA) / 0.1, 19) = 21.16\% < \alpha = 5\%$$

Exemple compétence Alfred

Question : Peut-on pour autant plutôt penser au vu de ce même jeu de données qu'Alfred n'est pas compétent (i.e. $H_1 : \sigma_A^2 > 0.1$) ?

Réponse : p-valeur droite = ?

Loi de $\widehat{\delta}_{\sigma_A^2, 0.1} (Y^A)$ sous $H_0 : \sigma_A^2 = 0.1 \Leftrightarrow \delta_{\sigma_A^2, 0.1} = 19$




$$p - \text{valeur(gauche)} \stackrel{R}{=} \text{pchisq}(19 * \text{var}(yA) / 0.1, 19) = 21.16\% < \alpha = 5\%$$

Exemple compétence Alfred

Question : Peut-on pour autant plutôt penser au vu de ce même jeu de données qu'Alfred n'est pas compétent (i.e. $H_1 : \sigma_A^2 > 0.1$) ?

Réponse : p-valeur droite = $1 - (\text{p-valeur gauche}) = 1 - 21.16\% = 78.84\%$ car **la somme des p-valeurs droite et gauche est égale à 1** !

Loi de $\widehat{\delta}_{\sigma_A^2, 0.1} (Y^A)$ sous $H_0 : \sigma_A^2 = 0.1 \Leftrightarrow \delta_{\sigma_A^2, 0.1} = 19$



$$p - \text{valeur(droite)} \stackrel{R}{=} 1 - \text{pchisq}(19 * \text{var}(yA) / 0.1, 19) = 78.84\% \not\ll \alpha = 5\%$$


Problématique de la dictée

Assertion d'intérêt : Il y a un effet sur le niveau des bacheliers en orthographe $\Leftrightarrow H_1 : \mu^D \neq 6.3$.

Décision (au vu des $n = 25$ données) :

Accepter H_1 si $\widehat{\delta_{\mu^D, 6.3}}(y^D) < \delta_{lim, \alpha/2}^-$ ou $\widehat{\delta_{\mu^D, 6.3}}(y^D) > \delta_{lim, \alpha/2}^+$

Loi de $\widehat{\delta_{\mu^D, 6.3}}(Y^D)$ sous $H_0 : \mu^D = 6.3 \Leftrightarrow \delta_{\mu^D, 6.3} = 0$




Problématique de la dictée

Assertion d'intérêt : Il y a un effet sur le niveau des bacheliers en orthographe $\Leftrightarrow H_1 : \mu^D \neq 6.3$.

Décision (au vu des $n = 25$ données) :

Accepter H_1 si $p\text{-valeur (bi)} = 2 \times \min(p\text{-valeur gauche}, p\text{-valeur droite}) < \alpha$

Loi de $\widehat{\delta_{\mu^D, 6.3}}(Y^D)$ sous $H_0 : \mu^D = 6.3 \Leftrightarrow \delta_{\mu^D, 6.3} = 0$



Plan


1 Rédaction standard

2 Problématiques avec 1 paramètre

3 P -valeur (suite)

4 Exercices (1 échantillon)

Nbre de paramètres pour décrire \mathbf{H}_1 ?



Données : $\mathbf{Y} = (Y_1, \dots, Y_n)$ avec $n \geq 30$ (n grand).

Statistique de test sous \mathbf{H}_0 :

p^\bullet	$\widehat{\delta_{p^\bullet, p_0}}(\mathbf{Y}) := \frac{\widehat{p^\bullet}(\mathbf{Y}) - p_0}{\sqrt{\frac{p_0 \times (1-p_0)}{n}}} \stackrel{\text{approx.}}{\rightsquigarrow} \mathcal{N}(0, 1)$
μ^\bullet	$\widehat{\delta_{\mu^\bullet, \mu_0}}(\mathbf{Y}) := \frac{\widehat{\mu^\bullet}(\mathbf{Y}) - \mu_0}{\widehat{\sigma_{\mu^\bullet}}(\mathbf{Y})} \stackrel{\text{approx.}}{\rightsquigarrow} \mathcal{N}(0, 1)$
σ_\bullet^2	$\widehat{\delta_{\sigma_\bullet^2, \sigma_0^2}}(\mathbf{Y}) := \frac{\widehat{\sigma_\bullet^2}(\mathbf{Y}) - \sigma_0^2}{\widehat{\sigma_\bullet^2}} \stackrel{\text{approx.}}{\rightsquigarrow} \mathcal{N}(0, 1)$

Chomage (abr. quant)

Question Peut-on penser que le taux de chômage en France serait cette année inférieur à 10% au vu des données yC en R ?

Indic R : `deltaEst.H0` $\simeq -0.942809$

`qnorm(0.95)` $\simeq 1.644854$

Assertion d'intérêt : $H_1 : p^C < 10\%$

Application numérique : puisqu'au vu des données,

$$\widehat{\delta_{p^C, 10\%}}(\mathbf{y}^C) \stackrel{R}{=} (16/200 - 0.1) / \text{sqrt}(0.1 * (1 - 0.1) / 200) \simeq -0.942809$$
$$\not\prec \delta_{lim, 5\%}^- \stackrel{R}{=} -\text{qnorm}(1 - .05) \simeq -1.644854$$

on ne peut pas plutôt penser (avec un risque de 5%) que le taux de chômage en France serait cette année inférieur à 10%.

Question Peut-on penser que le taux de chômage en France serait cette année inférieur à 10% au vu des données yC en R ?

Indic R : `pnorm(deltaEst.H0) ≈ 0.1728893`

Assertion d'intérêt : $H_1 : p^C < 10\%$

Application numérique : puisqu'au vu des données,

$p\text{-valeur} \stackrel{R}{=} \text{pnorm}((16/200 - 0.1)/\text{sqrt}(0.1 * (1 - 0.1)/200)) \approx 17.29\% \not< 5\%,$

on ne peut pas plutôt penser (avec un risque de 5%) que le taux de chômage en France serait cette année inférieur à 10%.

Question Comment s'écrit l'assertion d'intérêt H_1 en fonction des paramètres d'intérêt et d'écart ?

Assertion d'intérêt : le régime alimentaire du diététicien permet une perte de poids de 2 kilos par semaine

Indications R :

```
> length(yD)
[1] 50
> mean(yD)
[1] 4.5
> deltaEst.H0 # instruction R à fournir
[1] 2.044722
> qnorm(1-.05)
[1] 1.644854
```

Question Comment s'écrit l'assertion d'intérêt \mathbf{H}_1 en fonction des paramètres d'intérêt et d'écart ?

$$\mathbf{H}_1 : \mu^D > 4 \iff \delta_{\mu^D, 4} := \frac{\mu^D - 4}{\widehat{\sigma_{\mu^D}}} > 0$$

Hypothèses de test :

$$\mathbf{H}_1 : \mu^D > 4$$

Question : Quelle est la pire des situations, i.e. parmi toutes les situations quelle est celle qui engendre le plus grand risque d'erreur de première espèce ?

Hypothèses de test :

$$H_1 : \mu^D > 4$$

Question : Quelle est la pire des situations, i.e. parmi toutes les situations quelle est celle qui engendre le plus grand risque d'erreur de première espèce ?

Hypothèses de test : $H_0 : \mu^D = 4$ vs $H_1 : \mu^D > 4$

Question : Quelle est l'information du mathématicien quant au comportement de $\widehat{\delta_{\mu^D,4}}(\mathbf{Y}^D)$ dans la pire des situations ?

Hypothèses de test : $\mathbf{H}_0 : \mu^D = 4$ vs $\mathbf{H}_1 : \mu^D > 4$

Question : Quelle est l'information du mathématicien quant au comportement de $\widehat{\delta}_{\mu^D,4}(\mathbf{Y}^D)$ dans la pire des situations ?

Hypothèses de test : $H_0 : \mu^D = 4$ vs $H_1 : \mu^D > 4$

Statistique de test sous H_0 :

$$\widehat{\delta}_{\mu^D,4}(\mathbf{Y}^D) = \frac{\widehat{\mu^D}(\mathbf{Y}^D) - 4}{\widehat{\sigma_{\mu^D}}(\mathbf{Y}^D)} \stackrel{\text{approx.}}{\rightsquigarrow} \mathcal{N}(0, 1)$$

Diététicien (quantile)

Question : Comment s'écrit la règle de décision ne produisant pas plus de 5% d'erreur de première espèce ?

Indic R : `deltaEst.H0` $\simeq 2.044722$

`qnorm(1-.05)` $\simeq 1.644854$

Hypothèses de test : $H_0 : \mu^D = 4$ vs $H_1 : \mu^D > 4$

Statistique de test sous H_0 :

$$\widehat{\delta_{\mu^D, 4}}(\mathbf{Y}^D) = \frac{\widehat{\mu^D}(\mathbf{Y}^D) - 4}{\widehat{\sigma_{\mu^D}}(\mathbf{Y}^D)} \stackrel{\text{approx.}}{\rightsquigarrow} \mathcal{N}(0, 1)$$

Diététicien (quantile)

Question : Comment s'écrit la règle de décision ne produisant pas plus de 5% d'erreur de première espèce ?

Indic R : $\text{deltaEst.H0} \simeq 2.044722$

$\text{qnorm}(1 - .05) \simeq 1.644854$

Hypothèses de test : $H_0 : \mu^D = 4$ vs $H_1 : \mu^D > 4$

Statistique de test sous H_0 :

$$\widehat{\delta_{\mu^D, 4}}(\mathbf{Y}^D) = \frac{\widehat{\mu^D}(\mathbf{Y}^D) - 4}{\widehat{\sigma_{\mu^D}}(\mathbf{Y}^D)} \stackrel{\text{approx.}}{\rightsquigarrow} \mathcal{N}(0, 1)$$

Règle de Décision :

Accepter H_1 si $\widehat{\delta_{\mu^D, 4}}(\mathbf{y}^D) > \delta_{lim, 5\%}^+$

Diététicien (quantile)

Question : Comment concluerez-vous au vu des données yD en R ?

Indic R : $\text{deltaEst.H0} \simeq 2.044722$

$\text{qnorm}(1 - .05) \simeq 1.644854$

Hypothèses de test : $H_0 : \mu^D = 4$ vs $H_1 : \mu^D > 4$

Statistique de test sous H_0 :

$$\widehat{\delta_{\mu^D, 4}}(\mathbf{Y}^D) = \frac{\widehat{\mu^D}(\mathbf{Y}^D) - 4}{\widehat{\sigma_{\mu^D}}(\mathbf{Y}^D)} \stackrel{\text{approx.}}{\rightsquigarrow} \mathcal{N}(0, 1)$$


Règle de Décision :

Accepter H_1 si $\widehat{\delta_{\mu^D, 4}}(\mathbf{y}^D) > \delta_{lim, 5\%}^+$

Diététicien (quantile)

Question : Comment concluez-vous au vu des données yD en R ?

Indic R : $\text{deltaEst.H0} \simeq 2.044722$



Hypothèses de test : $H_0 : \mu^D = 4$ vs $H_1 : \mu^D > 4$

Statistique de test sous H_0 :

$\delta_{\mu^D, 4}(y^D) = \frac{\widehat{\mu^D}(y^D) - 4}{\widehat{\sigma_{\mu^D}}(y^D)}$

Règle de Décision :

Accepter H_1 si $\delta_{\mu^D, 4}(y^D) > \delta_{lim, 5\%}^+$

Conclusion : puisqu'au vu des données,

$$\begin{aligned}\widehat{\delta_{\mu^D, 4}}(y^D) &\stackrel{R}{=} (\text{mean}(yD) - 4) / \text{seMean}(yD) \simeq 2.045 \\ &> \delta_{lim, 5\%}^+ \stackrel{R}{=} \text{qnorm}(1 - .05) \simeq 1.645\end{aligned}$$

on peut plutôt penser (avec un risque de 5%) que le régime alimentaire du diététicien permet une perte de poids de 2 kilos par semaine.

Diététicien (quantile)

Question : Comment concluez-vous au vu des données yD en R ?

Indic R : `deltaEst.H0` $\simeq 2.044722$

`qnorm(1 - .05)` $\simeq 1.644854$

Hypothèses de test : $H_0 : \mu^D = 4$ vs $H_1 : \mu^D > 4$

Statistique de test sous H_0 :

$$\widehat{\delta_{\mu^D, 4}}(\mathbf{y}^D) = \frac{\widehat{\mu^D}(\mathbf{y}^D) - 4}{\widehat{\sigma_{\mu^D}}(\mathbf{y}^D)} \stackrel{\text{approx.}}{\leadsto} \mathcal{N}(0, 1)$$

Règle de Décision :

Accepter H_1 si $\widehat{\delta_{\mu^D, 4}}(\mathbf{y}^D) > \delta_{lim, 5\%}^+$

Conclusion : puisqu'au vu des données,

$$\begin{aligned} \widehat{\delta_{\mu^D, 4}}(\mathbf{y}^D) &\stackrel{R}{=} (\text{mean}(yD) - 4) / \text{seMean}(yD) \simeq 2.045 \\ &> \delta_{lim, 5\%}^+ \stackrel{R}{=} \text{qnorm}(1 - .05) \simeq 1.645 \end{aligned}$$

on peut plutôt penser (avec un risque de 5%) que le régime alimentaire du diététicien permet une perte de poids de 2 kilos par semaine.

Question Comment s'écrit l'assertion d'intérêt H_1 en fonction des paramètres d'intérêt et d'écart ?

Assertion d'intérêt : le régime alimentaire du diététicien permet une perte de poids de 2 kilos par semaine

Indications R :

```
> length(yD)
[1] 50
> mean(yD)
[1] 4.5
> pnorm(deltaEst.H0)
[1] 0.9795589
```

Question Comment s'écrit l'assertion d'intérêt \mathbf{H}_1 en fonction des paramètres d'intérêt et d'écart ?

$$\mathbf{H}_1 : \mu^D > 4 \iff \delta_{\mu^D, 4} := \frac{\mu^D - 4}{\widehat{\sigma_{\mu^D}}} > 0$$

Hypothèses de test :

$$\mathbf{H}_1 : \mu^D > 4$$

Question : Quelle est la pire des situations, i.e. parmi toutes les situations quelle est celle qui engendre le plus grand risque d'erreur de première espèce ?

Hypothèses de test :

$$H_1 : \mu^D > 4$$

Question : Quelle est la pire des situations, i.e. parmi toutes les situations quelle est celle qui engendre le plus grand risque d'erreur de première espèce ?

Hypothèses de test : $H_0 : \mu^D = 4$ vs $H_1 : \mu^D > 4$

Question : Quelle est l'information du mathématicien quant au comportement de $\widehat{\delta_{\mu^D, 4}}(\mathbf{Y}^D)$ dans la pire des situations ?

Hypothèses de test : $\mathbf{H}_0 : \mu^D = 4$ vs $\mathbf{H}_1 : \mu^D > 4$

Question : Quelle est l'information du mathématicien quant au comportement de $\widehat{\delta}_{\mu^D, 4}(\mathbf{Y}^D)$ dans la pire des situations ?

Hypothèses de test : $H_0 : \mu^D = 4$ vs $H_1 : \mu^D > 4$

Statistique de test sous H_0 :

$$\widehat{\delta}_{\mu^D, 4}(\mathbf{Y}^D) = \frac{\widehat{\mu^D}(\mathbf{Y}^D) - 4}{\widehat{\sigma_{\mu^D}}(\mathbf{Y}^D)} \stackrel{\text{approx.}}{\rightsquigarrow} \mathcal{N}(0, 1)$$

Question : Comment s'écrit la règle de décision ne produisant pas plus de 5% d'erreur de première espèce ?

Indic R : `pnorm(deltaEst.H0) ≈ 0.9795589`

Hypothèses de test : $H_0 : \mu^D = 4$ vs $H_1 : \mu^D > 4$

Statistique de test sous H_0 :

$$\widehat{\delta_{\mu^D, 4}}(\mathbf{Y}^D) = \frac{\widehat{\mu^D}(\mathbf{Y}^D) - 4}{\widehat{\sigma_{\mu^D}}(\mathbf{Y}^D)} \stackrel{\text{approx.}}{\rightsquigarrow} \mathcal{N}(0, 1)$$

Diététicien (p-valeur)

Question : Comment s'écrit la règle de décision ne produisant pas plus de 5% d'erreur de première espèce ?

Indic R : `pnorm(deltaEst.H0) ≈ 0.9795589`

Hypothèses de test : $H_0 : \mu^D = 4$ vs $H_1 : \mu^D > 4$

Statistique de test sous H_0 :

$$\widehat{\delta_{\mu^D, 4}}(\mathbf{Y}^D) = \frac{\widehat{\mu^D}(\mathbf{Y}^D) - 4}{\widehat{\sigma_{\mu^D}}(\mathbf{Y}^D)} \stackrel{\text{approx.}}{\sim} \mathcal{N}(0, 1)$$

Règle de Décision :

Accepter H_1 si p-valeur (droite) < 5%

Diététicien (p-valeur)

Question : Comment concluerez-vous au vu des données yD en R ?

Indic R : `pnorm(deltaEst.H0) ≈ 0.9795589`

Hypothèses de test : $H_0 : \mu^D = 4$ vs $H_1 : \mu^D > 4$

Statistique de test sous H_0 :

$$\widehat{\delta_{\mu^D, 4}}(\mathbf{Y}^D) = \frac{\widehat{\mu^D}(\mathbf{Y}^D) - 4}{\widehat{\sigma_{\mu^D}}(\mathbf{Y}^D)} \stackrel{\text{approx.}}{\rightsquigarrow} \mathcal{N}(0, 1)$$

Règle de Décision :


Accepter H_1 si p-valeur (droite) < 5%

Diététicien (p-valeur)

Question : Comment concluez-vous au vu des données yD en R ?

Indic R : $pnorm(deltaEst.H0) \simeq 0.9795589$

Hypothèses de test : $H_0 : \mu^D = 4$ vs $H_1 : \mu^D > 4$
Statistique de test sous H_0 :



Règle de Décision :

Accepter H_1 si p-valeur (droite) < 5%

Conclusion : puisqu'au vu des données,

$$\begin{aligned} \text{p-valeur}^R &= 1 - pnorm((\text{mean}(yD) - 4) / \text{seMean}(yD)) \\ &\simeq 2.04\% < 5\% \end{aligned}$$

on peut plutôt penser (avec un risque de 5%) que le régime alimentaire du diététicien permet une perte de poids de 2 kilos par semaine.

Question : Comment concluerez-vous au vu des données yD en R ?

Indic R : `pnorm(deltaEst.H0) ≈ 0.9795589`

Hypothèses de test : $H_0 : \mu^D = 4$ vs $H_1 : \mu^D > 4$

Statistique de test sous H_0 :

$$\widehat{\delta_{\mu^D, 4}}(\mathbf{Y}^D) = \frac{\widehat{\mu^D}(\mathbf{Y}^D) - 4}{\widehat{\sigma_{\mu^D}}(\mathbf{Y}^D)} \stackrel{\text{approx.}}{\leadsto} \mathcal{N}(0, 1)$$

Règle de Décision :

Accepter H_1 si p-valeur (droite) < 5%

Conclusion : puisqu'au vu des données,

$$\begin{aligned} \text{p-valeur}^R &= 1 - \text{pnorm}((\text{mean}(yD) - 4) / \text{seMean}(yD)) \\ &\simeq 2.04\% < 5\% \end{aligned}$$

on peut plutôt penser (avec un risque de 5%) que le régime alimentaire du diététicien permet une perte de poids de 2 kilos par semaine.

Diététicien (abr. quant)

Question Peut-on penser que le régime alimentaire du diététicien permet une perte de poids de 2 kilos par semaine au vu des données yD en R ?

Indic R : $\text{deltaEst.H0} \simeq 2.044722$
 $\text{qnorm}(0.95) \simeq 1.644854$

Assertion d'intérêt : $H_1 : \mu^D > 4$

Application numérique : puisqu'au vu des données,

$$\begin{aligned}\widehat{\delta_{\mu^D, 4}}(\mathbf{y}^D) &\stackrel{R}{=} (\text{mean}(yD) - 4) / \text{seMean}(yD) \simeq 2.044722 \\ &> \delta_{lim, 5\%}^+ \stackrel{R}{=} \text{qnorm}(1 - .05) \simeq 1.644854\end{aligned}$$

on peut plutôt penser (avec un risque de 5%) que le régime alimentaire du diététicien permet une perte de poids de 2 kilos par semaine.

Question Peut-on penser que le régime alimentaire du diététicien permet une perte de poids de 2 kilos par semaine au vu des données yD en R ?

Indic R : `pnorm(deltaEst.H0) ≈ 0.9795589`

Assertion d'intérêt : $H_1 : \mu^D > 4$

Application numérique : puisqu'au vu des données,

$$p\text{-valeur} \stackrel{R}{=} 1 - \text{pnorm}((\text{mean}(yD) - 4) / \text{seMean}(yD)) \approx 2.04\% < 5\%,$$

on peut plutôt penser (avec un risque de 5%) que le régime alimentaire du diététicien permet une perte de poids de 2 kilos par semaine.

Alfred (quantile)

Question Comment s'écrit l'assertion d'intérêt H_1 en fonction des paramètres d'intérêt et d'écart ?

Assertion d'intérêt : Alfred est compétent

Indications R :

```
> length(yA)
[1] 50
> var(yA)
[1] 0.06362229
> deltaEst.H0 # instruction R à fournir
[1] -2.762438
> -qnorm(1-.05)
[1] -1.644854
```

Alfred (quantile)

Question Comment s'écrit l'assertion d'intérêt \mathbf{H}_1 en fonction des paramètres d'intérêt et d'écart ?

$$\mathbf{H}_1 : \sigma_A^2 < 0.1 \iff \delta_{\sigma_A^2, 0.1} := \frac{\sigma_A^2 - 0.1}{\widehat{\sigma_A^2}} < 0$$

Hypothèses de test :

$$\mathbf{H}_1 : \sigma_A^2 < 0.1$$

Alfred (quantile)

Question : Quelle est la pire des situations, i.e. parmi toutes les situations quelle est celle qui engendre le plus grand risque d'erreur de première espèce ?

Hypothèses de test :

$$H_1 : \sigma_A^2 < 0.1$$

Alfred (quantile)

Question : Quelle est la pire des situations, i.e. parmi toutes les situations quelle est celle qui engendre le plus grand risque d'erreur de première espèce ?

Hypothèses de test : $H_0 : \sigma_A^2 = 0.1$ vs $H_1 : \sigma_A^2 < 0.1$

Alfred (quantile)

Question : Quelle est l'information du mathématicien quant au comportement de $\widehat{\delta_{\sigma_A^2, 0.1}}(\mathbf{Y}^A)$ dans la pire des situations ?

Hypothèses de test : $\mathbf{H}_0 : \sigma_A^2 = 0.1$ vs $\mathbf{H}_1 : \sigma_A^2 < 0.1$

Alfred (quantile)

Question : Quelle est l'information du mathématicien quant au comportement de $\widehat{\delta}_{\sigma_A^2, 0.1}(\mathbf{Y}^A)$ dans la pire des situations ?

Hypothèses de test : $H_0 : \sigma_A^2 = 0.1$ vs $H_1 : \sigma_A^2 < 0.1$

Statistique de test sous H_0 :

$$\widehat{\delta}_{\sigma_A^2, 0.1}(\mathbf{Y}^A) = \frac{\widehat{\sigma}_A^2(\mathbf{Y}^A) - 0.1}{\widehat{\sigma}_{\sigma_A^2}^2(\mathbf{Y}^A)} \stackrel{\text{approx.}}{\rightsquigarrow} \mathcal{N}(0, 1)$$

Alfred (quantile)

Question : Comment s'écrit la règle de décision ne produisant pas plus de 5% d'erreur de première espèce ?

Indic R : `deltaEst.H0` $\simeq -2.762438$
`-qnorm(1-.05)` $\simeq -1.644854$

Hypothèses de test : $H_0 : \sigma_A^2 = 0.1$ vs $H_1 : \sigma_A^2 < 0.1$

Statistique de test sous H_0 :

$$\widehat{\delta_{\sigma_A^2, 0.1}}(\mathbf{Y}^A) = \frac{\widehat{\sigma_A^2}(\mathbf{Y}^A) - 0.1}{\widehat{\sigma_{\sigma_A^2}}(\mathbf{Y}^A)} \stackrel{\text{approx.}}{\rightsquigarrow} \mathcal{N}(0, 1)$$

Alfred (quantile)

Question : Comment s'écrit la règle de décision ne produisant pas plus de 5% d'erreur de première espèce ?

Indic R : `deltaEst.H0` $\simeq -2.762438$
`-qnorm(1-.05)` $\simeq -1.644854$

Hypothèses de test : $H_0 : \sigma_A^2 = 0.1$ vs $H_1 : \sigma_A^2 < 0.1$

Statistique de test sous H_0 :

$$\widehat{\delta_{\sigma_A^2, 0.1}}(\mathbf{Y}^A) = \frac{\widehat{\sigma_A^2}(\mathbf{Y}^A) - 0.1}{\widehat{\sigma_{\sigma_A^2}}(\mathbf{Y}^A)} \stackrel{\text{approx.}}{\rightsquigarrow} \mathcal{N}(0, 1)$$

Règle de Décision :

Accepter H_1 si $\widehat{\delta_{\sigma_A^2, 0.1}}(\mathbf{y}^A) < \delta_{lim, 5\%}^-$

Alfred (quantile)

Question : Comment concluez-vous au vu des données yA en R ?

Indic R : $\text{deltaEst.H0} \simeq -2.762438$

$-\text{qnorm}(1-.05) \simeq -1.644854$

Hypothèses de test : $H_0 : \sigma_A^2 = 0.1$ vs $H_1 : \sigma_A^2 < 0.1$

Statistique de test sous H_0 :

$$\widehat{\delta_{\sigma_A^2, 0.1}}(\mathbf{Y}^A) = \frac{\widehat{\sigma_A^2}(\mathbf{Y}^A) - 0.1}{\widehat{\sigma_{\sigma_A^2}}(\mathbf{Y}^A)} \stackrel{\text{approx.}}{\rightsquigarrow} \mathcal{N}(0, 1)$$


Règle de Décision :

Accepter H_1 si $\widehat{\delta_{\sigma_A^2, 0.1}}(\mathbf{y}^A) < \delta_{lim, 5\%}^-$

Alfred (quantile)

Question : Comment concluez-vous au vu des données yA en R ?

Indic R : $\text{deltaEst.H0} \simeq -2.762438$



Hypothèses de test : $H_0 : \sigma_A^2 = 0.1$ vs $H_1 : \sigma_A^2 < 0.1$
Statistique de test sous H_0 :

Règle de Décision :

Accepter H_1 si $\widehat{\delta_{\sigma_A^2, 0.1}}(\mathbf{y}^A) < \delta_{\text{lim}, 5\%}^-$

Conclusion : puisqu'au vu des données,

$$\widehat{\delta_{\sigma_A^2, 0.1}}(\mathbf{y}^A) \stackrel{R}{=} (\text{var}(\mathbf{y}^A) - 0.1) / \text{seVar}(\mathbf{y}^A) \simeq -2.762$$

$$< \delta_{\text{lim}, 5\%}^- \stackrel{R}{=} -\text{qnorm}(1 - .05) \simeq -1.645$$

on peut plutôt penser (avec un risque de 5%) que Alfred est compétent.

Alfred (quantile)

Question : Comment concluez-vous au vu des données yA en R ?

Indic R : $\text{deltaEst.H0} \simeq -2.762438$

$-\text{qnorm}(1 - .05) \simeq -1.644854$

Hypothèses de test : $H_0 : \sigma_A^2 = 0.1$ vs $H_1 : \sigma_A^2 < 0.1$

Statistique de test sous H_0 :

$$\widehat{\delta_{\sigma_A^2, 0.1}}(\mathbf{Y}^A) = \frac{\widehat{\sigma_A^2}(\mathbf{Y}^A) - 0.1}{\widehat{\sigma_{\sigma_A^2}}(\mathbf{Y}^A)} \stackrel{\text{approx.}}{\rightsquigarrow} \mathcal{N}(0, 1)$$

Règle de Décision :

Accepter H_1 si $\widehat{\delta_{\sigma_A^2, 0.1}}(\mathbf{y}^A) < \delta_{lim, 5\%}^-$

Conclusion : puisqu'au vu des données,

$$\widehat{\delta_{\sigma_A^2, 0.1}}(\mathbf{y}^A) \stackrel{R}{=} (\text{var}(yA) - 0.1) / \text{seVar}(yA) \simeq -2.762$$

$$< \delta_{lim, 5\%}^- \stackrel{R}{=} -\text{qnorm}(1 - .05) \simeq -1.645$$

on peut plutôt penser (avec un risque de 5%) que Alfred est compétent.

Question Comment s'écrit l'assertion d'intérêt H_1 en fonction des paramètres d'intérêt et d'écart ?

Assertion d'intérêt : Alfred est compétent

Indications R :

```
> length(yA)
[1] 50
> var(yA)
[1] 0.06362229
> pnorm(deltaEst.H0)
[1] 0.002868572
```

Question Comment s'écrit l'assertion d'intérêt \mathbf{H}_1 en fonction des paramètres d'intérêt et d'écart ?

$$\mathbf{H}_1 : \sigma_A^2 < 0.1 \iff \delta_{\sigma_A^2, 0.1} := \frac{\sigma_A^2 - 0.1}{\widehat{\sigma_A^2}} < 0$$

Hypothèses de test :

$$\mathbf{H}_1 : \sigma_A^2 < 0.1$$

Question : Quelle est la pire des situations, i.e. parmi toutes les situations quelle est celle qui engendre le plus grand risque d'erreur de première espèce ?

Hypothèses de test :

$$H_1 : \sigma_A^2 < 0.1$$

Question : Quelle est la pire des situations, i.e. parmi toutes les situations quelle est celle qui engendre le plus grand risque d'erreur de première espèce ?

Hypothèses de test : $H_0 : \sigma_A^2 = 0.1$ vs $H_1 : \sigma_A^2 < 0.1$

Alfred (p-valeur)

Question : Quelle est l'information du mathématicien quant au comportement de $\widehat{\delta_{\sigma_A^2, 0.1}}(\mathbf{Y}^A)$ dans la pire des situations ?

Hypothèses de test : $\mathbf{H}_0 : \sigma_A^2 = 0.1$ vs $\mathbf{H}_1 : \sigma_A^2 < 0.1$

Alfred (p-valeur)

Question : Quelle est l'information du mathématicien quant au comportement de $\widehat{\delta}_{\sigma_A^2, 0.1}(\mathbf{Y}^A)$ dans la pire des situations ?

Hypothèses de test : $H_0 : \sigma_A^2 = 0.1$ vs $H_1 : \sigma_A^2 < 0.1$

Statistique de test sous H_0 :

$$\widehat{\delta}_{\sigma_A^2, 0.1}(\mathbf{Y}^A) = \frac{\widehat{\sigma}_A^2(\mathbf{Y}^A) - 0.1}{\widehat{\sigma}_{\sigma_A^2}^2(\mathbf{Y}^A)} \stackrel{\text{approx.}}{\rightsquigarrow} \mathcal{N}(0, 1)$$

Alfred (p-valeur)

Question : Comment s'écrit la règle de décision ne produisant pas plus de 5% d'erreur de première espèce ?

Indic R : `pnorm(deltaEst.H0) ≈ 0.002868572`

Hypothèses de test : $H_0 : \sigma_A^2 = 0.1$ vs $H_1 : \sigma_A^2 < 0.1$

Statistique de test sous H_0 :

$$\widehat{\delta_{\sigma_A^2, 0.1}}(\mathbf{Y}^A) = \frac{\widehat{\sigma_A^2}(\mathbf{Y}^A) - 0.1}{\widehat{\sigma_{\sigma_A^2}}(\mathbf{Y}^A)} \stackrel{\text{approx.}}{\rightsquigarrow} \mathcal{N}(0, 1)$$

Question : Comment s'écrit la règle de décision ne produisant pas plus de 5% d'erreur de première espèce ?

Indic R : `pnorm(deltaEst.H0) ≈ 0.002868572`

Hypothèses de test : $H_0 : \sigma_A^2 = 0.1$ vs $H_1 : \sigma_A^2 < 0.1$

Statistique de test sous H_0 :

$$\widehat{\delta_{\sigma_A^2, 0.1}}(\mathbf{Y}^A) = \frac{\widehat{\sigma_A^2}(\mathbf{Y}^A) - 0.1}{\widehat{\sigma_{\sigma_A^2}}(\mathbf{Y}^A)} \stackrel{\text{approx.}}{\rightsquigarrow} \mathcal{N}(0, 1)$$

Règle de Décision :

Accepter H_1 si p-valeur (gauche) < 5%

Alfred (p-valeur)

Question : Comment concluez-vous au vu des données yA en R ?

Indic R : `pnorm(deltaEst.H0) ≈ 0.002868572`

Hypothèses de test : $H_0 : \sigma_A^2 = 0.1$ vs $H_1 : \sigma_A^2 < 0.1$

Statistique de test sous H_0 :

$$\widehat{\delta_{\sigma_A^2, 0.1}}(\mathbf{Y}^A) = \frac{\widehat{\sigma_A^2}(\mathbf{Y}^A) - 0.1}{\widehat{\sigma_{\sigma_A^2}}(\mathbf{Y}^A)} \stackrel{\text{approx.}}{\rightsquigarrow} \mathcal{N}(0, 1)$$

Règle de Décision :


Accepter H_1 si p-valeur (gauche) < 5%

Alfred (p-valeur)

Question : Comment concluez-vous au vu des données yA en R ?

Indic R : `pnorm(deltaEst.H0) ≈ 0.002868572`

Hypothèses de test : $H_0 : \sigma_A^2 = 0.1$ vs $H_1 : \sigma_A^2 < 0.1$
Statistique de test sous H_0 :



Règle de Décision :

Accepter H_1 si p-valeur (gauche) < 5%

Conclusion : puisqu'au vu des données,

$$\begin{aligned} \text{p-valeur} & \stackrel{\text{R}}{=} \text{pnorm}((\text{var}(\mathbf{y}^A) - 0.1) / \text{seVar}(\mathbf{y}^A)) \\ & \simeq 0.29\% < 5\% \end{aligned}$$

on peut plutôt penser (avec un risque de 5%) que Alfred est compétent.

Alfred (p-valeur)

Question : Comment concluez-vous au vu des données yA en R ?

Indic R : `pnorm(deltaEst.H0) ≈ 0.002868572`

Hypothèses de test : $H_0 : \sigma_A^2 = 0.1$ vs $H_1 : \sigma_A^2 < 0.1$

Statistique de test sous H_0 :

$$\widehat{\delta_{\sigma_A^2, 0.1}}(\mathbf{Y}^A) = \frac{\widehat{\sigma_A^2}(\mathbf{Y}^A) - 0.1}{\widehat{\sigma_{\sigma_A^2}}(\mathbf{Y}^A)} \stackrel{\text{approx.}}{\rightsquigarrow} \mathcal{N}(0, 1)$$

Règle de Décision :

Accepter H_1 si p-valeur (gauche) < 5%

Conclusion : puisqu'au vu des données,

$$\begin{aligned} \text{p-valeur} &\stackrel{\text{R}}{=} \text{pnorm}((\text{var}(yA) - 0.1) / \text{seVar}(yA)) \\ &\simeq 0.29\% < 5\% \end{aligned}$$

on peut plutôt penser (avec un risque de 5%) que Alfred est compétent.

Question Peut-on penser que Alfred est compétent au vu des données yA en R ?

Indic R : $\text{deltaEst.H0} \simeq -2.762438$

$\text{qnorm}(0.95) \simeq 1.644854$

Assertion d'intérêt : $H_1 : \sigma_A^2 < 0.1$

Application numérique : puisqu'au vu des données,

$$\widehat{\delta_{\sigma_A^2, 0.1}}(yA) \stackrel{R}{=} (\text{var}(yA) - 0.1) / \text{seVar}(yA) \simeq -2.762438 \\ < \delta_{lim, 5\%}^- \stackrel{R}{=} -\text{qnorm}(1 - .05) \simeq -1.644854$$

on peut plutôt penser (avec un risque de 5%) que Alfred est compétent.

Question Peut-on penser que Alfred est compétent au vu des données yA en R ?

Indic R : `pnorm(deltaEst.H0) ≈ 0.002868572`

Assertion d'intérêt : $H_1 : \sigma_A^2 < 0.1$

Application numérique : puisqu'au vu des données,

$p\text{-valeur} \stackrel{R}{=} \text{pnorm}((\text{var}(yA) - 0.1) / \text{seVar}(yA)) \approx 0.29\% < 5\%,$

on peut plutôt penser (avec un risque de 5%) que Alfred est compétent.

Nbre de paramètres pour décrire \mathbf{H}_1 ?

1 paramètre

Gaussien

Données : $\mathbf{Y} = (Y_1, \dots, Y_n)$ avec $Y \rightsquigarrow \mathcal{N}(\mu^\bullet, \sigma_\bullet)$

Statistique de test sous \mathbf{H}_0 :

μ^\bullet	$\widehat{\delta_{\mu^\bullet, \mu_0}}(\mathbf{Y}) := \frac{\widehat{\mu^\bullet}(\mathbf{Y}) - \mu_0}{\widehat{\sigma_{\mu^\bullet}}(\mathbf{Y})} \rightsquigarrow \mathcal{St}(n-1)$
σ_\bullet^2	$\widehat{\delta_{\sigma_\bullet^2, \sigma_0^2}}(\mathbf{Y}) := (n-1) \times \frac{\widehat{\sigma_\bullet^2}(\mathbf{Y})}{\sigma_0^2} \rightsquigarrow \chi^2(n-1)$

Question Peut-on penser que le régime alimentaire du diététicien permet une perte de poids au vu des données AV-AP en R ?

Indic R : `deltaEst.H0` $\simeq 5.25$

$$\text{qt}(0.95, 9) \simeq 1.833113$$

Assertion d'intérêt : $H_1 : \mu^D > 0$ avec μ^D = moyenne de $Y^D (= Y^{AV} - Y^{AP})$

Application numérique : puisqu'au vu des données,

$$\begin{aligned}\widehat{\delta_{\mu^D, 0}}(y^D) &\stackrel{R}{=} (\text{mean}(AV - AP) - \theta) / \text{seMean}(AV - AP) \simeq 5.25 \\ &> \delta_{lim, 5\%}^+ \stackrel{R}{=} \text{qt}(1 - .05, 9) \simeq 1.833113\end{aligned}$$

on peut plutôt penser (avec un risque de 5%) que le régime alimentaire du diététicien permet une perte de poids.

Question Peut-on penser que le régime alimentaire du diététicien permet une perte de poids au vu des données AV-AP en R ?

Indic R : `pt(deltaEst.H0, 9) ≈ 0.9997362`

Assertion d'intérêt : $H_1 : \mu^D > 0$ avec μ^D = moyenne de $Y^D (= Y^{AV} - Y^{AP})$

Application numérique : puisqu'au vu des données,

$p\text{-valeur} \stackrel{R}{=} 1 - pt((\text{mean}(AV - AP) - 0) / \text{seMean}(AV - AP), 9) \approx 0.03\% < 5\%$,

on peut plutôt penser (avec un risque de 5%) que le régime alimentaire du diététicien permet une perte de poids.

Alfred (quantile)

Question Comment s'écrit l'assertion d'intérêt H_1 en fonction des paramètres d'intérêt et d'écart ?

Assertion d'intérêt : Alfred est compétent

Indications R :

```
> length(yA)
[1] 20
> var(yA)
[1] 0.07325571
> deltaEst.H0 # instruction R à fournir
[1] 13.91858
> qchisq(.05,19)
[1] 10.11701
```

Question Comment s'écrit l'assertion d'intérêt \mathbf{H}_1 en fonction des paramètres d'intérêt et d'écart ?

$$\mathbf{H}_1 : \sigma_A^2 < 0.1 \iff \delta_{\sigma_A^2, 0.1} := (20 - 1) \frac{\sigma_A^2}{0.1} < 20 - 1$$

Hypothèses de test :

$$\mathbf{H}_1 : \sigma_A^2 < 0.1$$

Alfred (quantile)

Question : Quelle est la pire des situations, i.e. parmi toutes les situations quelle est celle qui engendre le plus grand risque d'erreur de première espèce ?

Hypothèses de test :

$$H_1 : \sigma_A^2 < 0.1$$

Alfred (quantile)

Question : Quelle est la pire des situations, i.e. parmi toutes les situations quelle est celle qui engendre le plus grand risque d'erreur de première espèce ?

Hypothèses de test : $H_0 : \sigma_A^2 = 0.1$ vs $H_1 : \sigma_A^2 < 0.1$

Alfred (quantile)

Question : Quelle est l'information du mathématicien quant au comportement de $\widehat{\delta_{\sigma_A^2, 0.1}}(\mathbf{Y}^A)$ dans la pire des situations ?

Hypothèses de test : $\mathbf{H}_0 : \sigma_A^2 = 0.1$ vs $\mathbf{H}_1 : \sigma_A^2 < 0.1$

Alfred (quantile)

Question : Quelle est l'information du mathématicien quant au comportement de $\widehat{\delta_{\sigma_A^2, 0.1}}(\mathbf{Y}^A)$ dans la pire des situations ?

Hypothèses de test : $H_0 : \sigma_A^2 = 0.1$ vs $H_1 : \sigma_A^2 < 0.1$

Statistique de test sous H_0 :

$$\widehat{\delta_{\sigma_A^2, 0.1}}(\mathbf{Y}^A) = (20 - 1) \frac{\widehat{\sigma_A^2}(\mathbf{Y}^A)}{0.1} \rightsquigarrow \chi^2(20 - 1)$$

Alfred (quantile)

Question : Comment s'écrit la règle de décision ne produisant pas plus de 5% d'erreur de première espèce ?

Indic R : $\text{deltaEst.H0} \simeq 13.91858$

$\text{qchisq}(.05, 19) \simeq 10.11701$

Hypothèses de test : $H_0 : \sigma_A^2 = 0.1$ vs $H_1 : \sigma_A^2 < 0.1$

Statistique de test sous H_0 :

$$\widehat{\delta_{\sigma_A^2, 0.1}}(\mathbf{Y}^A) = (20 - 1) \frac{\widehat{\sigma_A^2}(\mathbf{Y}^A)}{0.1} \rightsquigarrow \chi^2(20 - 1)$$

Alfred (quantile)

Question : Comment s'écrit la règle de décision ne produisant pas plus de 5% d'erreur de première espèce ?

Indic R : $\text{deltaEst.H0} \simeq 13.91858$

$\text{qchisq}(.05, 19) \simeq 10.11701$

Hypothèses de test : $H_0 : \sigma_A^2 = 0.1$ vs $H_1 : \sigma_A^2 < 0.1$

Statistique de test sous H_0 :

$$\widehat{\delta_{\sigma_A^2, 0.1}}(\mathbf{Y}^A) = (20 - 1) \frac{\widehat{\sigma_A^2}(\mathbf{Y}^A)}{0.1} \rightsquigarrow \chi^2(20 - 1)$$

Règle de Décision :

Accepter H_1 si $\widehat{\delta_{\sigma_A^2, 0.1}}(\mathbf{y}^A) < \delta_{lim, 5\%}^-$

Alfred (quantile)

Question : Comment concluez-vous au vu des données yA en R ?

Indic R : $\text{deltaEst.H0} \simeq 13.91858$

$\text{qchisq}(.05, 19) \simeq 10.11701$

Hypothèses de test : $H_0 : \sigma_A^2 = 0.1$ vs $H_1 : \sigma_A^2 < 0.1$

Statistique de test sous H_0 :

$$\widehat{\delta_{\sigma_A^2, 0.1}}(\mathbf{Y}^A) = (20 - 1) \frac{\widehat{\sigma_A^2}(\mathbf{Y}^A)}{0.1} \rightsquigarrow \chi^2(20 - 1)$$


Règle de Décision :

Accepter H_1 si $\widehat{\delta_{\sigma_A^2, 0.1}}(\mathbf{y}^A) < \delta_{lim, 5\%}^-$

Alfred (quantile)

Question : Comment concluez-vous au vu des données yA en R ?

Indic R : $\text{deltaEst.H0} \simeq 13.91858$



Hypothèse de test : $H_0 : \sigma_A^2 = 0.1$ vs $H_1 : \sigma_A^2 < 0.1$

Statistique de test sous H_0 :

$$\widehat{\delta}_{\sigma_A^2, 0.1} (y^A) = (20 - 1) \frac{\widehat{\sigma}_A^2 (y^A)}{0.1} \sim \chi^2(20 - 1)$$

Règle de Décision :

Accepter H_1 si $\widehat{\delta}_{\sigma_A^2, 0.1} (y^A) < \delta_{lim, 5\%}^-$

Conclusion : puisqu'au vu des données,

$$\widehat{\delta}_{\sigma_A^2, 0.1} (y^A) \stackrel{R}{=} (\text{length}(yA) - 1) * \text{var}(yA) / 0.1 \simeq 13.92$$

$$\not< \delta_{lim, 5\%}^- \stackrel{R}{=} qchisq(.05, 19) \simeq 10.12$$

on ne peut pas plutôt penser (avec un risque de 5%) que Alfred est compétent.

Alfred (quantile)

Question : Comment concluez-vous au vu des données yA en R ?

Indic R : `deltaEst.H0` $\simeq 13.91858$

`qchisq(.05, 19)` $\simeq 10.11701$

Hypothèses de test : $H_0 : \sigma_A^2 = 0.1$ vs $H_1 : \sigma_A^2 < 0.1$

Statistique de test sous H_0 :

$$\widehat{\delta_{\sigma_A^2, 0.1}}(\mathbf{Y}^A) = (20 - 1) \frac{\widehat{\sigma_A^2}(\mathbf{Y}^A)}{0.1} \rightsquigarrow \chi^2(20 - 1)$$

Règle de Décision :

Accepter H_1 si $\widehat{\delta_{\sigma_A^2, 0.1}}(\mathbf{y}^A) < \delta_{lim, 5\%}^-$

Conclusion : puisqu'au vu des données,

$$\widehat{\delta_{\sigma_A^2, 0.1}}(\mathbf{y}^A) \stackrel{R}{=} (\text{length}(yA) - 1) * \text{var}(yA) / 0.1 \simeq 13.92$$

$$\not< \delta_{lim, 5\%}^- \stackrel{R}{=} \text{qchisq}(.05, 19) \simeq 10.12$$

on ne peut pas plutôt penser (avec un risque de 5%) que Alfred est compétent.

Question Comment s'écrit l'assertion d'intérêt H_1 en fonction des paramètres d'intérêt et d'écart ?

Assertion d'intérêt : Alfred est compétent

Indications R :

```
> length(yA)
[1] 20
> var(yA)
[1] 0.07325571
> pchisq(deltaEst.H0,19)
[1] 0.2115835
```

Question Comment s'écrit l'assertion d'intérêt \mathbf{H}_1 en fonction des paramètres d'intérêt et d'écart ?

$$\mathbf{H}_1 : \sigma_A^2 < 0.1 \iff \delta_{\sigma_A^2, 0.1} := (20 - 1) \frac{\sigma_A^2}{0.1} < 20 - 1$$

Hypothèses de test :

$$\mathbf{H}_1 : \sigma_A^2 < 0.1$$

Question : Quelle est la pire des situations, i.e. parmi toutes les situations quelle est celle qui engendre le plus grand risque d'erreur de première espèce ?

Hypothèses de test :

$$H_1 : \sigma_A^2 < 0.1$$

Question : Quelle est la pire des situations, i.e. parmi toutes les situations quelle est celle qui engendre le plus grand risque d'erreur de première espèce ?

Hypothèses de test : $H_0 : \sigma_A^2 = 0.1$ vs $H_1 : \sigma_A^2 < 0.1$

Alfred (p-valeur)

Question : Quelle est l'information du mathématicien quant au comportement de $\widehat{\delta_{\sigma_A^2, 0.1}}(\mathbf{Y}^A)$ dans la pire des situations ?

Hypothèses de test : $\mathbf{H}_0 : \sigma_A^2 = 0.1$ vs $\mathbf{H}_1 : \sigma_A^2 < 0.1$

Alfred (p-valeur)

Question : Quelle est l'information du mathématicien quant au comportement de $\widehat{\delta_{\sigma_A^2, 0.1}}(\mathbf{Y}^A)$ dans la pire des situations ?

Hypothèses de test : $H_0 : \sigma_A^2 = 0.1$ vs $H_1 : \sigma_A^2 < 0.1$

Statistique de test sous H_0 :

$$\widehat{\delta_{\sigma_A^2, 0.1}}(\mathbf{Y}^A) = (20 - 1) \frac{\widehat{\sigma_A^2}(\mathbf{Y}^A)}{0.1} \rightsquigarrow \chi^2(20 - 1)$$

Question : Comment s'écrit la règle de décision ne produisant pas plus de 5% d'erreur de première espèce ?

Indic R : `pchisq(deltaEst.H0, 19) ≈ 0.2115835`

Hypothèses de test : $H_0 : \sigma_A^2 = 0.1$ vs $H_1 : \sigma_A^2 < 0.1$

Statistique de test sous H_0 :

$$\widehat{\delta_{\sigma_A^2, 0.1}}(\mathbf{Y}^A) = (20 - 1) \frac{\widehat{\sigma_A^2}(\mathbf{Y}^A)}{0.1} \rightsquigarrow \chi^2(20 - 1)$$

Question : Comment s'écrit la règle de décision ne produisant pas plus de 5% d'erreur de première espèce ?

Indic R : `pchisq(deltaEst.H0, 19) ≈ 0.2115835`

Hypothèses de test : $H_0 : \sigma_A^2 = 0.1$ vs $H_1 : \sigma_A^2 < 0.1$

Statistique de test sous H_0 :

$$\widehat{\delta_{\sigma_A^2, 0.1}}(\mathbf{Y}^A) = (20 - 1) \frac{\widehat{\sigma_A^2}(\mathbf{Y}^A)}{0.1} \rightsquigarrow \chi^2(20 - 1)$$

Règle de Décision :

Accepter H_1 si p-valeur (gauche) < 5%

Question : Comment concluez-vous au vu des données yA en R ?

Indic R : `pchisq(deltaEst.H0, 19) ≈ 0.2115835`

Hypothèses de test : $H_0 : \sigma_A^2 = 0.1$ vs $H_1 : \sigma_A^2 < 0.1$

Statistique de test sous H_0 :

$$\widehat{\delta_{\sigma_A^2, 0.1}}(\mathbf{Y}^A) = (20 - 1) \frac{\widehat{\sigma_A^2}(\mathbf{Y}^A)}{0.1} \rightsquigarrow \chi^2(20 - 1)$$


Règle de Décision :

Accepter H_1 si p-valeur (gauche) < 5%

Alfred (p-valeur)

Question : Comment concluez-vous au vu des données yA en R ?

Indic R : `pchisq(deltaEst.H0, 19) ≈ 0.2115835`



Règle de Décision :

Accepter H_1 si p-valeur (gauche) < 5%

Conclusion : puisqu'au vu des données,

p-valeur $\stackrel{R}{=} \text{pchisq}(\text{length}(yA) - 1) * \text{var}(yA) / 0.1, 19$
 $\simeq 21.16\% \not< 5\%$

on ne peut pas plutôt penser (avec un risque de 5%) que Alfred est compétent.

Question : Comment concluez-vous au vu des données yA en R ?

Indic R : `pchisq(deltaEst.H0, 19) ≈ 0.2115835`

Hypothèses de test : $H_0 : \sigma_A^2 = 0.1$ vs $H_1 : \sigma_A^2 < 0.1$

Statistique de test sous H_0 :

$$\widehat{\delta_{\sigma_A^2, 0.1}}(\mathbf{Y}^A) = (20 - 1) \frac{\widehat{\sigma_A^2}(\mathbf{Y}^A)}{0.1} \rightsquigarrow \chi^2(20 - 1)$$

Règle de Décision :

Accepter H_1 si p-valeur (gauche) < 5%

Conclusion : puisqu'au vu des données,

$$\begin{aligned} \text{p-valeur}^R &= \text{pchisq}((\text{length}(yA) - 1) * \text{var}(yA) / 0.1, 19) \\ &\simeq 21.16\% \not< 5\% \end{aligned}$$

on ne peut pas plutôt penser (avec un risque de 5%) que Alfred est compétent.